

Renegade



FastDraw takes 4-5 days to work.

SOFT BAIT

Active Ingredient: Difethialone
6 MONTHS

CLEAN OUT
BAITING
OR CORRECTIVE
ACTION



Bromethalin

3 MONTHS
Chlorophacinone

3 MONTHS
Bromadiolone



SOFT BAIT



Rodent Feed Consumption

Consumo de alimento para roedores



House Mouse/Ratón Doméstico

- 1 house mouse/ratón doméstico = 1/10 oz. per day/por dia
 - 10 mice/ratones domésticos = 1 oz. per day/por dia
 - 160 mice/ratones domésticos = 1 lb. per day/por dia
- 50 female/mujer 50 male/hombre
- 2,800 mice per year/ratones domésticos por año
6,387.5 lbs. per year/por año**



Norway Rat/Rata de Noruega

- 1 Norway rat/rata de Noruega = up to 1 oz. per day/hasta 1 oz. por dia
 - 16 Norway rat/ratas de Noruega = 1 lb. per day/por dia
- 50 female/mujer 50 male/hombre
- 4,200 Norway rats per year/ratas de Noruega por año
95,812.5 lbs. per year/por año**




Roof Rat/Rata de Techo

- 1 roof rat/rata de techo = up to 1 oz. per day/hasta 1 oz. por dia
 - 16 roof rats/ ratas de techo = 1 lb. per day/por dia
- 50 female/mujer 50 male/hombre
- 2,400 roof rats per year/ratas de techo por año
54,750 lbs. per year/por año**

These calculations are an approximation based on the data provided in Liphatech's Rodent Reference Guide.
Estos cálculos son una aproximación basada en los datos proporcionados en la Guía de referencia de roedores de Liphatech.

Rodent Reproductive Cycle

House mice, Norway rats and roof rats share several reproductive characteristics. In stable environments with adequate food, water and harborage, they can reproduce year around. In less favorable conditions, reproduction is limited to spring and autumn. After giving birth, they can be in heat and become pregnant again in as little as 24-48 hours. Pregnant females can also still lactate to feed their current litter, although this can lengthen the gestational period.



House mice reach sexually maturity in 5-8 weeks. Female mice reproduce up to 8 times in their lifespan, with litters averaging 4-7 pups. For a single female mouse, that equals up to 56 offspring annually.

Norway and roof rats reach sexual maturity in 8-12 weeks. Female Norway rats average 4-7 litters per year, each with 8-12 pups per litter. Female roof rats average 4-6 litters per year, each with 4-8 pups per litter.

Ciclo reproductivo de roedores

Los ratones domésticos, las ratas noruegas y las ratas de techo comparten varias características reproductivas. En ambientes estables con alimentos, agua y refugio adecuados, pueden reproducirse durante todo el año. En condiciones menos favorables, la reproducción se limita a la primavera y el otoño. Después de dar a luz, pueden estar en celo y quedar embarazadas nuevamente en tan solo 24-48 horas. Las mujeres embarazadas también pueden seguir lactando para alimentar a su camada actual, aunque esto puede alargar el período de gestación.

Los ratones domésticos alcanzan la madurez sexual en 5-8 semanas. Las hembras de los ratones se reproducen hasta 8 veces en su vida, con camadas de un promedio de 4-7 crías. Para una sola hembra ratón, eso equivale a hasta 56 descendientes al año.

Noruega y las ratas de techo alcanzan la madurez sexual en 8-12 semanas. Las ratas hembra noruegas tienen un promedio de 4-7 camadas por año, cada una con 8-12 crías por camada. Las ratas con techo femenino tienen un promedio de 4-6 camadas por año, cada una con 4-8 crías por camada.